

Projekt städkvalitet, SÄS

Ett pågående projekt som drivs av Vårdhygien tillsammans med Lokaler och service, Fastighet stöd och service.
Projektgrupp: Jenny Andersson, Jon Edman Wallér, Linda Hallberg, Malin Ulander, Jennie Wessbo, Gabriella Wramdemark, Zeina Zimmerman

Bakgrund

Projektet genomförs som en del i en utbrottshantering, där lokalvård av god kvalitet är en av delarna som krävs för utbrottskontroll. Nuvarande metod för kvalitetskontroll är visuell (INSTA-800) och fångar därmed bara vad ögat kan se.

Syfte

Testa och utvärdera kvalitetskontroll av städning med ATP-mätning, som komplement till ordinarie visuella kvalitetsbedömning.



Metod

300 ATP-prover genomfördes fördelat på fem slumpvisa ytor (av 25 resp. 35 tänkbara ytor för daglig resp. slutstäd) i fem rum på sex somatiska vårdavdelningar.

ATP-mätare av märket CleanTrace användes. Gränsvärden för godkänt/underkänt resultat användes enligt tillverkarens rekommendation (>500 RLU = underkänt).

Återkoppling av resultat och dialog med lokalvårdare skedde om möjligt i samband med provtagningen. Uppföljande provtagning efter omstäddad yta skedde vid ett antal tillfällen tillsammans med lokalvårdare för gemensamt lärande.

Observationer och dialoger under projektet kompletterade testresultaten och bidrog till att identifiera områden med förbättringspotential.



Vi har samma målsättning - Rena och säkra vårdlokaler

Kvalitetsbrister åtgärdas i samverkan

Resultat

Dagligt städ

Medianvärdet för alla mätningar var 134 RLU, med variation från 8 till 4560 RLU. Inga stora skillnader noterades mellan avdelningarna. Vid uppdelning av provtagningsytor i kategorier hade hållare för tvål, handsprit, torkpapper, toalettpapper och handskar något högre medianvärde än övriga kategorier. Endast en av sex avdelningar blev godkänd enligt standarden SS 8760014:2017.

Slutstäd

Medianvärdet för alla mätningar var 142 RLU, med variation från 22 till 63 039 RLU. En avdelning hade ett högre medianvärde än övriga. Inga större skillnader noterades mellan provtagningsytorna. Ingen avdelning blev godkänd enligt standarden SS 8760014:2017.

Observation och dialog

Slitna ytskikt och ytor med ofördelaktig design som är svåra att få rena förekom på alla vårdavdelningar. Lokalvårdstjänster samordnades inte enligt grundintention pga. bristande rutiner i kommunikation till lokalvård från vård. Gränsdragning i ansvar mellan vård och lokalvård var otydlig för båda parter. Tillgång till rätt städmaterial var inte säkerställd. Avvikelse från ordinarie städmetod samt avvikelser kring uppföljning noterades. Kunskap om bakomliggande syfte med olika lokalvårdsmetoder saknades för lokalvårdare.

Slutsats

ATP-mätningar, observationer och dialoger visade att det finns kvalitetsbrister gällande vårdlokalernas renhet som inte fångas upp av ordinarie metod för kvalitetskontroll.

Orsaker till brister är kopplat till flera samverkande faktorer, som enbart kan åtgärdas i samverkan mellan vård- och lokalvårdsorganisation.

Förbättringsåtgärder är initierade inom samtliga definierade förbättringsområden och följs upp inom projektet, som ska avlägga slutrapport 2025-05.

ATP (adenotrifosfat): Molekyl som celler använder för att lagra energi och driva energikrävande processer. Mängd ATP ger mått på förekomst av organiskt material.
RLU (relativa ljusenheter): Måttenheter som används för att ange ATP-nivå. Ju högre RLU, desto mer ATP.